

Zápis z jednání SKAP 11.02.2025 (online)

Účastníci (abecedně, bez titulů): Bezdíčková, Boráň, Dlouhý, Halačová, Jakubec, Kacerovský, Matoušková, Melicherčík, Murínová, Nyč, Pokludová, Prokeš, Storová, Strojil, Štefan, Šíma, Trojánek, Ulrych, Urbánková, Verdánová, Votava, Wagner

Omluveni (abecedně, bez titulů): Černý, Křížová, Pokorná, Šrámek, Žemličková

Úvod

Dr. Trojánek přivítal všechny zúčastněné a informoval je o změně ve vedení SKAP – novým předsedou byl jmenován dr. Štefan. Dr. Trojánek poděkoval všem za dosavadní spolupráci, zůstává jako člen SKAP. Dr. Štefan přivítal přítomné a poděkoval dr. Trojánkovi za dosavadní vedení SKAP.

K zápisu z minulého jednání nejsou připomínky.

1. Kancelář zdravotního pojištění

Ing. Wagner přislíbil na příští jednání připravit prezentaci o aktualitách v činnosti KZP ve vztahu ke sledování spotřeby antibiotik u praktických lékařů.

2. Aktualizace seznamu esenciálních antiinfektiv

Zástupci SKAP připravili změny v Seznamu esenciálních antiinfektiv v oblasti antibiotik. Provedené změny v oblasti antibiotik jsou v bodech shrnuty níže:

- Zařazení označení pediatrických forem, revize forem u některých ATB
- Odstranění rifampicinu (je uveden v antituberkulotické léčbě)
- Odstranění meropenemu/vaborbaktamu
- Zařazení aztreonemu/avibaktamu
- Cefadroxil – alternativa při nedostupnosti fenoxymetylpenicilinu a flukloxacilinu

3. Návrhy na úpravu webu SKAP

Dr. Štefan informoval o plánu aktualizace webu SKAP, o změnách budou členové informováni. Případné návrhy na vylepšení webu lze posílat dr. Štefanovi na marek.stefan@fnmotol.cz.

4. Příprava nových dokumentů

Probíhá finalizace dokumentu „Asymptomatické bakteriurie před plánovanou operací kloubní náhrady“, následně bude toto odborné stanovisko uveřejněno na webu SKAP.

Prim. Dlouhý se vyjádřil k vhodnosti přípravy dalšího dokumentu souvisejícího se screeningem kolonizace *Staphylococcus aureus* před ortopedickými výkony. Účastníci souhlasí s užitečností tohoto dokumentu. Prim. Dlouhý pošle účastníkům jednání doporučený postup ESCMID, kterým se lze inspirovat (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39154859/>).

Dr. Štefan dokončuje přípravu odborného stanoviska „AWaRe klasifikace ATB“, dokument bude odeslán členům SKAP k připomínkám.

Dokument o depotních penicilínech (prim. Dlouhý) je v přípravě, mezitím přišel požadavek od prof. Davida Pokorného z I. Ortopedické kliniky FNM – níže uvedené dotazy na pendeponizaci u pacientů s anamnézou erysipelu a plánem implantace TEP kolenního kloubu.

- Jakou ATB profylaxi volit peroperačně i.v. a následně třeba X týdnů per os?
- Pendeponizace? Jak dlouho?

- Je před provedením operace vhodné vyšetření ASLO?

5. Mezioborová spolupráce na tvorbě doporučených postupů

Profesor Černý emailem informoval o přípravě doporučeného postupu AMS (antimicrobial stewardship) v intenzivní péči a požádal o stanovení 2 zástupců SKAP, kteří by se na přípravě podíleli. Po domluvě se SKAP zúčastní (prof. Žemličková a dr. Štefan).

SIL ČLS JEP připravuje praktický doporučený postup diagnostiky a léčby chřipky. Dokument bude ke schválení předložen i SKAP.

6. Různé

Dokumenty SKAP budou uveřejňovány v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (KMIL), popřípadě v dalších odborných časopisech dle vhodnosti dosahu na cílovou skupinu zdravotníků

Blok SKAP bude součástí setkání pracovníků ATB center „Antibiotická politika Soláň“ 29.-31.5. Jindřichův Hradec

Urologická společnost vydala stanovisko k postexpoziční profylaxi sexuálně přenosných chorob doxycyklinem (DoxyPEP):

Stanovisko ČUS k podávání doxycyklinu v rámci Doxy PEP

Česká urologická společnost nesouhlasí s podáváním DXM v dávce 50 mg v rámci postkoitální antimikrobiální profylaxe s výjimkou násilné trestné činnosti. Zde by měla být však být podána dávka terapeutická, tedy v dávkování 4 mg/kg, lékařem, který pacienta/pacientku po násilném nechráněném styku ošetří.

Zdůvodnění

- nadužívání antimikrobiálních přípravků vede k navýšování rezistence vůči nim; celosvětově jsou populace vyzývány k racionální antimikrobiální léčbě
- rádi bychom zabránili „zdiskreditování“ skupiny tetracyklinů s následným nárůstem rezistence, obdobně jak se stalo skupině makrolidů nebo fluorochinolonů
- preferujeme bariérovou ochranu jako primární prevenci při rizikovém sexuálním chování a nenahrazování primární prevence farmakoterapií

Stanovisko ČUS je v souladu s dalšími odbornými společnostmi.

Dr. Dlouhý na to reagoval představením Doporučeného postupu SIL ČSL JEP (https://infektologie.cz/standardy2/DP_PrEP_PEP_24.pdf), kde je DoxyPEP věnována pozornost, včetně adekvátního dávkování (200 mg jednorázově, tedy nikoliv 50 mg, jak uvedeno výše) a přesného popsání benefitů i rizik. Jedná se o strategii používanou i v zahraničí a postavenou na EMB datech.

Termín další schůzky: květen/červen 2025 (bude upřesněno)

Zapsal: Štefan